肥満治療の実際

肥満症の治療は減食を主体にし、食事療法がその中心になる。しかし、食事制限だけでは徐脂肪体重だけが減少し、体脂肪が減らない症例が少なくない。可能な限り運動療法と併用して行うことで、治療効率が増す。

肥満の判定基準

BMI	日本肥満学会
< 18.5	低体重
18.5 ≤ ~ < 25	普通体重
25 ≤ ~ < 30	肥満 (1 度)
30 ≤ ~ < 35	肥満 (2 度)
35 ≤ ~ < 40	肥満 (3 度)
40 ≤	肥満 (4 度)

食事療法

エネルギー制限の程度によって、3 種類に分類。

1. 減食療法 (1 日 1200kcal 程度まで)

エネルギー摂取量をいつもより少なく抑える程度の軽い食事療法。

2. 低エネルギー食療法 (1 日 600~1200kcal)

栄養バランスのとれた通常食による低エネルギー食療法。

3. 超低エネルギー食療法 (1 日 200~600kcal)

摂取エネルギーを基礎代謝以下に抑え、徐脂肪成分の減少を最低限にとどめる療法。体を与える影響が強く、栄養バランスも失われやすいため、医師の管理のもと注意深く実施。自然食品ではなく、粉末、液体などの規格食品（フォーミュラ食）を用いる。副作用としてケトアシドーシス、起立性低血圧、嘔気、嘔吐、便秘などがある。

食事療法のポイント

- ・肥満症の食事療法では、たんぱく質を多めにし、脂質を少なめに抑えるのが原則。
- ・ビタミンやミネラルが欠乏する場合は、まず全身倦怠感が強くなり疲労しやすくなるため、1 日必要量が充足されているかをチェック。

不足しがちな栄養素		不足を補う食品
ビタミン A	ナイアシン	豆類
ビタミン D	ビタミン C	牛乳
ビタミン B1	鉄	チーズ
ビタミン B2	カルシウム	緑黄色野菜

運動療法

- ・体トレーニングで体脂肪を減少させる場合、健康的な減量スピードは一般的に週に 0.5 kg 前後が目安。
- ・そのために必要なトレーニング量は 1 日の消費エネルギーの約 10% 前後。当初の目安は 1 日約 300kcal 程度。
- ・推奨されるのは有酸素運動で、自覚的運動強度は「きつく」ない程度の心拍数に留意。